

3 juli 2015

Actueel WG van het middel Met52 OD, 14883 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Aardbei (bedekte teelt)	mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	2 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte teelt)	trips ¹ wittevlieg ³	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met niet-eetbare schil (bedekte teelt)	trips ¹ wittevlieg ³	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per teeltcyclus	3	4 uur
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i>	trips ¹	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Ui-achtigen (onbedekte teelt)	Trips ⁵	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Prei (onbedekte teelt)	Trips ⁵	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Gerbera-(bedekte teelt)	wittevlieg ³	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	-

¹ Californische thrips (*Frankliniella occidentalis*)

² Bonenspintmijt (*Tetranychus urticae*)

³ Kaswittevlieg (*Trialeurodes vaporariorum*)

⁴ Kaswittevlieg (*Trialeurodes vaporariorum*)

⁵Tabakstrips (*Thrips tabaci*)

Het gebruik in de teelt van aardbei (onbedekte teelt), oliehoudende zaden, vezelgewassen, peulvruchten, kers, pruim, bessen, druif, braam- en framboosachtigen, vijg en kiwi, boon met peul (bedekte teelt), koolgewassen (bedekte teelt), stengelgroenten (bedekte teelt), kruidenteelt vers of gedroogd, de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, veredelingsteelt en zaadteelt (bedekte teelt) en “onbedekte teelt van veredeling en zaadteelt van groentegewassen, fruitgewassen, kruiden, sierteeltgewassen, bieten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap” is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er zijn voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Aardbei (onbedekte teelt)	trips ¹ , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Oliehoudende zaden	Trips ⁵ , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Vezelgewassen	Trips ⁵ , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Peulvruchten	trips ^{1,5} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Kers (bedekte teelt)	mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Kers (onbedekte teelt)	mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur
Pruim (bedekte teelt)	vlinders ⁷	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur

Toepassings- gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Pruim (onbedekte teelt)	vlinders ⁷	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur
Bessen (bedekte teelt)	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,5 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Bessen (onbedekte teelt)	trips ^{1,5} , mijt ²	1,2 l/ha	1,2 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur
Druif (bedekte teelt)	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Druif (onbedekte teelt)	trips ^{1,5} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur
Braam- en framboosachtigen (bedekte teelt)	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,5 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Braam- en framboosachtigen (onbedekte teelt)	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur
Vijg (bedekte teelt)	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Kiwi (bedekte teelt)	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Kiwi (onbedekte teelt)	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	1,2 l/ha	1,2 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur
Boon met peul (bedekte teelt)	trips ^{1,5} , wittevlies ^{3,4} , mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur

Toepassings- gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn
Koolgewassen (bedekte teelt)	trips ^{1,5} , wittevlieg ⁶ , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Stengelgroenten (bedekte teelt)	trips ^{1,5} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per teeltcyclus	3	4 uur
Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt)	trips ^{1,5} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt)	trips ^{1,5} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	wittevlieg ³	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Veredelingsteelt en zaadteelt (bedekte teelt)	trips ^{1,4} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Onbedekte teelt van: Veredeling en zaadteelt van groentegewassen, fruitgewassen, kruiden, sierteeltgewassen, bieten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap	trips ^{1,5} , wittevlieg ^{3,4} , mijten ²	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur

¹ Californische trips (*Frankliniella occidentalis*)

² Bonenspintmijt (*Tetranychus urticae*)

³ Kaswittevlieg (*Trialetrodes vaporariorum*)

⁴ Tabakswittevlieg (*Bemisia tabaci*)

⁵ Tabakstrips (*Thrips tabaci*)

⁶ Koolwittevlieg (*Aleyrodes proletella*)

⁷ Pruimenmot (*Cydia funebrana*)

Toepassingsvoorwaarden

Let op: voor het gereed maken van de spuitvloeistof gelden speciale instructies, raadpleeg hiervoor de aanbevelingen van de fabrikant.

In de teelt van ui-achtigen en prei het middel toepassen in 200-1500 liter water per ha.

In de teelt van aardbei (onbedekte teelt) het middel toepassen in 300-1600 liter water per ha.

In de teelt van bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) het middel toepassen in 300-1500 liter water per ha.

In de teelt van bessen, druif en braam- en framboosachtigen (onbedekte teelt) het middel toepassen in 400-1200 liter water per ha.

Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden bij gebruik in bedekte teelten. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

De gewasveiligheid van Met52 OD in de wintermaanden is voor de bedekte teelten van aardbei, vruchtgroenten van cucurbitaceae met en zonder eetbare schil, vruchtgroenten van solanaceae en gerbera niet onderbouwd. Voer een proefbespuiting uit voordat Met52 OD in de bedekte teelt van deze gewassen op grote schaal toegepast wordt.

